

## WAM-Porocol® használati utasítás

### ➤ **Hatásmechanizmus:**

WAM-Porocol egy szintetikus előállított szagriasztó, amely bizonyítottan több hónapig fejt ki vad riasztó hatását.

WAM-Porocol-t nagy vadváltásoknál a közlekedési utak mellé, illetve a vadragások elkerülése érdekében az erdőben és mezőkön kell kihelyezni. Ezen kívül kiválóan alkalmas a macskák távoltartására a búza kaszáláskor.

### ➤ **Hatás tartama:**

A hatóanyag tartja a hatását 4-6 hónapon keresztül.

### ➤ **Hatásfok:**

WAM-Porocol párologtatással fejt ki hatását, ezért eső és egyéb csapadék elöl védeni kell. Az eredeti, "gyári" megoldás, hogy a (külön kapható) gyári műanyagcsöveket leszúrjuk a talajba. A védőkosárka tetejét leemelve, az üveget felbontva, belehelyezzük a párologtató kanócot. S így a már védőkosárba helyezett üveget, a tetővel rögzítjük.

Sajnos a magyarországi tapasztalat az, hogy a kihelyezett védelmet gyakran ellopják. Ezért érdemes, az üveget közvetlenül szigetelőszalaggal valamire felrögzíteni, és ha lehetséges, a csapadéktól bármilyen "haranggal", felülről védeni. Ez lehet tejfölös pohár, műanyag üveg stb. A riasztószer textil vagy szivacs átitatásával is kijuttatható.

### ➤ **Alkalmazási módok:**

- Ahol nagy vadváltásokkal kell számolni, ott a közlekedési utak hosszában kell az üvegcséket 50 m-es távolságban, 30 m-el az utak előtt kihelyezni. (lásd 1. melléklet)
- Azért, hogy vaddisznó beváltását pl. a kukoricaföldekre vagy más kultúrákba elkerüljük, az üvegcséket 40 m távolságban a földekre kell kihelyezni. (lásd 2. és 3. melléklet)
- A vadragások ellen elegendő, ha 4-5 párologtató üvegcsét, helyeznek el hektáronként (távol tartandó vad orrmagasságában) a fiatal növények között. (lásd 4. melléklet)
- Macskamentéshez az üvegcséket 1-2 nappal a búza kaszálása előtt kell kihelyezni.
- Szőlő ültetvényeknél a fiatal hajtások tökéletes védelmére szolgál, a bor minőségének befolyásolása nélkül, 30-40 méterenként kiakasztva.

Minden alkalmazási módnál figyelni kell a fő szélirányra. A hatóanyagot mindig a széliránnyal megegyező irányban kell kihelyezni. Lásd mellékletek.

### ➤ **Alkalmazási idő:**

WAM-Porocol egész évben használható.

### ➤ **Alkalmazási mennyiség:**

WAM-Porocol 4-5 üvegce / hektár

➤ **Különleges utasítások:**

A vad és az erdő közötti felborult egyensúlynál pl. egy nagyon magas vadnyomásnál és a vele egyidejűleg, minőségileg és mennyiségileg elegendő, takarmányban fellépő hiánynál a WAM-Porocol-nál is, mint minden más repellens vadriasztó szernél, hatás csökkenés előfordulhat.

Gondoljon a környezetre! A csavarfedelelet és az üvegpalackot szelektív hulladékba tegye.

A szer nem veszélyes méhekre (B4).


➤ **Munkavédelmi utasítások a felhasználó védelmére:**

Minden szükségtelen érintkezés a szerrel kerülendő! Megszegése egészségkárosodáshoz vezethet. A WAM-Porocol szintetikus összetevői alapján, a törvényadó által, a kezeléskor csak **GUMIKESZTYŰ használata előírt.**

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal alaposan mossuk le vízzel és szappannal.

➤ **Gyári (külön kapható) párologtató csövecskék felállítása:**

A kb. 1 m hosszú műanyag karót a földbe dugni, majd a párologtató fejet a karóra ráhúzni és a fedelét levenni. Az WAM-Porocol üvegcséket kinyitni. A kanócot az üvegbe kell dugni és aztán az üvegpalackot a párologtató fejre kell helyezni. Végül a fedelet ismét a párologtató fejre kell (hallhatóan) rápattintani.

WAM-Porocol kihelyezésének módja  
vadkár elkerülése végett

WAM-Porocol kihelyezési módja  
kukorica tábla védelmében,  
ha a vad keletről várható



WAM-Porocol üvegcsék



KUKORICA TÁBLA

40m

40m

40m

40m

SZÉLIRÁNY

SZÉLIRÁNY

SZÉLIRÁNY

SZÉLIRÁNY


SZÉLIRÁNY




ERDŐ



WAM-Porocol kihelyezési módja  
kukorica tábla védelmében,  
ha a vad nyugatról várható



Üvegcséket kb. 40m ként, 50m mélyen, az erdőben kell kihelyezni



## WAM-Porocol kihelyezésének módja

Egy 16 hektáros fiatal ültetvény  
rágás és hántás vadkár  
megelőzéséhez, 25db WAM-Porocol  
üvegcsé szükséges, melyet  
40m\*40m-es raszterben kell kihelyezni